EXPOSÉ DES TITRES

57

TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DE DOCTEER

AUGUSTE VOISIN

Médeda de l'horqueo de la Sulpériliere, laurent de l'Académie de médesine, de Flexina, Messère du Connell d'hygiene et de subshrite du dépurieusent de la Soine.

PARIS

IMPRIMERIES RÉUNIES 2, RUR MIGNON, 2

1892

.

0.00

HUBSTV 11.8 2 1.7.31

-

TRAVAUX SCIENTIFIQUES

PUBLIÉS DE 1884 A 1892

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Altérations des cellules cérébrales dans l'aliénation mentale.

(Annales médico-psychologiques, 1886.)

Dans une discussion soulevée à la Société médico-psychologique un les affections orfétrales anciennes, M. Auguste Voisin a exposé le résultat de ses recherches, à assuri que, lorsque des celtules cérébraites out été altéries dans un accès de folis, elles ne peuvent guériet elles sont déstinées à subir des modifications qui adoutisent à la nécrose, et il explaque ainsi l'indiriorité mentale observée chez les indivitus qui out éta álisides.

> Intoxication et paralysie générale. (Annales médico-psychologiques, 1890.)

M. Aug. Voisin maintient dans ce travail l'unité de la paralysie générale des aliénés et ne reconnaît comme telle que la maladie qui présente comme lésions, outre ses symptômes spéciaux, la méningoencéphalite chronique, telle qu'elle a été établie par Calmeil et Baillarger.

Recherches sur l'unatomie pathologique de la folie avec délire partiel.

(Académie de médecine, séance du 3 mai 1892.)

M. Aug. Voisin a communiqué à l'Académie de médecine un certain nombre d'observations et de desins recueilli sur des alidents atteints de folie vésanique avec délire partiel chez lesquels les altères de folie vésanique avec délire partiel chez lesquels les altères internet des promiteres de douisénes circonvolutions frontales et dans le tiers interne des frontales et pariétales accendantes. Les lésions qu'a monteés M. Voisin à l'Académie sont des anvériens miliaires, des taches jaunes et vort-de-gris, constitutés, au microscope, par des infarctus, par des anas de pipment et de la nécroes vasualiaires, par des anérsimes d'un certain volume, par des épithéliennes, par des sarcômes, par des géodes et par des congestions cérèbro-ménagies.

M. Voisin a pensé que la présentation de lésions aussi évidentes constituerait un apport utile aux recherches sur les localisations cérébrales et à l'anatomie pathologique de la folie.

THÉRAPEUTIOUE

Observation de paralysie nerveuse et d'abolition de la parole guéries subitement à la suite d'une attaque convulsive et d'une colère.

(Annales médico-psychologiques, jusvier 1881.)

Traitement de la folie par les injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine tel qu'il est pratiqué à Illenau (Grand-duché de Bade).

(Bulletin de thérapeutique, 1881.)

M. Auguste Voisin a rapporté d'un voyage à l'asile d'Illenau des observations qui ne laissent aucun doute sur le bon effet du truitement morphinique pratiqué par Roller et Hergt.

Utilité de la cumisole de force et des moyens de contention dans le traitement de la folie.

(Annales médico-psychologiques, juillet 1886.)

L'emploi des moyens contentifs est une nécessité dans un certain nombre de cas qu'à énumérés M. Voisin dans une discussion à la Société médico-spechologique et en particulier lersque les appareits à pansements, les emplatres, les révulsifs cottanés doivent être applides, locque l'agitation est tries grande, lorsque le malade a bescin de marcher, lorsqu'il faut le protéger contre lui-nême, contre ses amuraies habitudes, etc., etc. Du reste, M. Voitan a signalé plusieum faits qu'il a observés en Angleterre où le sor restreint n'est pas appliqué invariablement, comme on le croit.

Emploi du spéculum laryngien dans l'alimentation forcée chez les aliénés.

(Annales médico-psychologiques, dicembre 1884.)

La difficulté que l'On renontre quelquefois à introduire la sonde cosphagienne par le nez ou par la bouche a donné l'idée à M. Voisin d'introduire préalablement dans la bouche le spéculum laryagien et de fitre pénétrer la sonde dans l'osophage entre les valves préalablement ésertées de cet instrument.

Curabilité de la paralysie générale des aliénés.

(Annales médico-psychologiques, 1888.)

Dans une discussion à la Société médio-psychologique, M. Auguste Voisin a cité des observations qui lui sont personnelles et il a montré deux individus qui, ayant êté considérés par des médecins très autorisés et entre autres par Laségue comme atteints de paralysie générale des alténés et comme incurables, ont guéri.

Traitement de la sitiophobie chez les aliénés

par le lavage de l'estomac.

(Bulletin de thérapeutique, 30 janvier 1891.)

Certains délires de forme mélancolique et hypocondriaque sont évidemment liés à des troubles gastro-intestinaux. M. Voisin emploie fréquemment dans ces cas le lavage de l'estomac et en a donné dans ce travail un certain nombre d'observations suivies de guérison.

Emploi de la thérapeutique suggestive dans les maladies nervoso-mentales

(Bulletin de thérapeutique, 1891.)

Cette méthode a permis à M. Voisin de guérir des malades atteints de mélancolie, d'hallucinations diverses. Hen donne plusieurs observations.

PATHOLOGIE

De la température dans les maladies mentales. (France médicate, 30 novembre 1888.)

M. Aug. Voisin a signalé, dans une série de leçons professées à la Salpêtrière, l'existence de l'hyperthermie crânienne, principalement aux régions temporo-pariétales dans certaines maladies mentales.

> Étude sur la température des parois de la tête ehez les aliénés.
>
> (Congrès de médecine mentale, 1888.)

De nonbreuncs observations out permis à M. Voisin de démontre que la température des parsis de la tête varie che le a fisiblies et que dans certaines formes elle cat supérieure ou inférieure à l'état normal et que même elle est quelquéois égale et supérieure à la température atallière. Il a cité des cas où l'hyperfermie criaineme était exactement en rapport avec des lésions congestives de la région du cervau correspondant ou sous-ajecente.

De la mélancolie dans ses rapports avec la paralysie générale. (Ouvrige couvoiné par l'Académie de médecine (prix Lefevre) et publié dans les Mémoires de l'Académie, 1880.)

M. Auguste Voisin a montré dans ce mémoire que souvent la paralysie générale débutait par une période mélancolique qui pouvait persister pendant asser longtemps et qu'elle pouvait se mélanger à un état bypocondrisque et quelquefois même coexister avec du délire de satisfaction et de grandeur.

Aliénation mentale consécutive à l'intoxication par le sulfure de carbone. (Annates médico-psychologiques, mai 1884.)

Ce travail lu à la Société médico-psychologique renferme plusieurs observations dans lesquelles l'intoxication sulfo-carbonatée est sculc en cause.

> Alcoolisme par le vulnéraire anisé, (Congrès international de médecine, 1889.)

M. Voisin a observé un certain nombre d'aliènés présentant une forme spéciale de délire alcoolique caractérisée plus spécialement par de la stupeur, de l'indifférence, du mutisme, du laissersaller d'une durée de près d'un an et guérissant après ce terme, délire qui se rattachait d'une façon non douteuse à l'usage abusif du vulnéraire anisé.

Il est à noter que cette forme de délire est absolument semblable à l'éthérisme chronique. Des analyses chimiques ont permis à M. Voisin de constater que dans le corps humain le vulnéraire anisé donne lieu à la formation d'un éther; de là la ressemblance entre cet état morbide et l'éthérisme chronique.

MÉDECINE LÉGALE

Du divorce et de la folie. (Annales médio-psychologiques, juin 1885.)

Dats une discussion à la Société médico-pey lologique, M. Angusto Vissin a soutem l'opinitum que le divorce dermit être accordé lorsque, par supercherie et par trouperie, la famille d'un conjoint ou un conjoint qui est auténit d'épilepsie, de folie intermittente, de dipsomanie et a'imbéditillé, n'en aura pas avent l'autre famillé et l'autre conjoint, et que cette mesure ne devrait être prise pour cause de folie sans une enquête et une consulation de cinq médecins.

9340. - Emprimerica réasson, S. res Micnes, Panis.